

# คาถา 5 ย.



1. อย่าเหยยให้สุนัขโมโห โกรธ

โรคพิษสุนัขบ้า อันตรายใกล้ตัวกว่าที่คิด



2. อย่าเหยียบ หาง หัว ตัว ขา หรือ ทำให้สุนัขหรือสัตว์ต่าง ๆ ตกใจ

ถึงเวลาแล้วที่เราควรทำความเข้าใจกับโรคนี้ให้มากขึ้น

3. อย่าแยกสุนัขที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่า



เพื่อให้เรารับมือได้อย่างปลอดภัยและช่วยกัน



4. อย่าหยิบ ขามข้าวหรือเคลื่อนย้ายอาหารขณะที่สุนัขกำลังกินอาหาร

หยุดการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า



5. อย่ายุ่งกับสุนัขหรือ สัตว์ต่าง ๆ นอกบ้านที่ไม่มีเจ้าของ หรือไม่ทราบประวัติ



## โรคพิษสุนัขบ้า



ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค  
กองสาธารณสุข  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

# โรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ  
เกิดจากเชื้อไวรัสชื่อ “เรบีส” (Rabies virus)

## อาการในคน

จะแสดงอาการหลังรับเชื้อประมาณ 3 สัปดาห์ - 6 เดือน  
อาจนานจน ถึง 1 ปีจากอาการเริ่มแรก คือ เบื่ออาหาร เจ็บคอ  
มีไข้ อ่อนเพลีย คับรุนแรงบริเวณบาดแผล กระจกกระส่ำย  
ปวดท้องน้อย กล้ามเนื้อขากระตุก แน่นหน้าอก  
หายใจไม่ออก เกร็ง อัมพาต และตายในที่สุด

## อาการในสัตว์

ระยะฟักตัวของโรคจะอยู่ในช่วง 3-8 สัปดาห์ ไม่เกิน 6 เดือน  
โดยเมื่อสุนัขแสดงอาการแล้วจะตายภายใน 10 วัน อาการมี 3 ระยะ คือ

- ระยะแรก : มีนิสัยเปลี่ยนไปจากเดิม
- ระยะตื่นเต้น : กระวนกระวาย ไม่อยู่นิ่ง ม่านตาขยายกว้าง
- ระยะอัมพาต : คอตกล ลิ้นสีแดงคล้ายห้อย น้ำลายไหล  
อ่อนแรง ทรงตัวไม่ได้ อัมพาตและตายในที่สุด

และที่น่ากลัวที่สุดคือ

ปัจจุบัน

โรคนี้ยังไม่มียารักษา  
คนหรือสัตว์ที่ติดเชื้อมี

โอกาสเสียชีวิตสูงถึง  
100 เปอร์เซ็นต์

## การติดต่อของโรคพิษสุนัขบ้า



เกิดจากการสัมผัสกับน้ำลายของสัตว์  
ที่เป็นพาหะของโรค ผ่านการถูกสัตว์  
กัด ข่วน หรือน้ำลายกระเด็นเข้า  
บาดแผลหรือบริเวณผิวหนังที่เป็น  
รอยถลอก ถูกสัตว์เลียบริเวณเยื่อหูตา  
จมูก หรือปาก



### การติดต่อโรค

ถูกสัตว์ที่มีเชื้อ  
กัด ข่วน  
เลียบาดแผล



ดูอย่างไร...ว่าสัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้า

ระยะ  
เริ่มแรก

นิสัยเปลี่ยน  
ไม่จำเสียง หงุดหงิด  
เก็บตัว หวาดระแวง



ระยะ  
ตื่นเต้น

กระวนกระวาย  
กัดไม่เลือก  
เห่าหอน



ระยะ  
อัมพาต

น้ำลายไหล  
ค้างห้อยตก อ้าปากค้าง  
กินอาหารกลืนน้ำไม่ได้  
เป็นอัมพาต ตาย



## ปฏิบัติตัวอย่างไร ปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า



เมื่อถูกสัตว์เลี้ยงกัด หรือข่วนควรปฏิบัติดังนี้



ล้างแผล

ล้างแผลด้วยน้ำสะอาด  
หรือสบู่

ใส่ยา

ใส่ยาฆ่าเชื้อ เช่น ทิงเจอร์ไอโอดีน  
หรือเบตาดีน



งัดหมา

อาจจับหรือจำกัดบริเวณสัตว์  
เพื่อเฝ้าดูอาการ 2 อาทิตย์  
แต่หากไม่สามารถทำได้ เช่น  
เป็นสัตว์จรจัด หรือสัตว์หายตัว  
โปรดแจ้งการจำกัดบริเวณ  
ที่ไม่จำเป็น หากสัตว์มีอาการ  
ผิดปกติรีบแจ้งแพทย์

หาหมอ

ผู้ป่วยที่โดนสัตว์กัดหรือข่วน  
ทุกราย ต้องไปพบแพทย์  
โดยเร็ว เพื่อพิจารณาฉีด  
วัคซีนพิษสุนัขบ้า และป้องกัน  
บาดทะยัก



### วิธีการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

1. นำสัตว์เลี้ยงไปรับวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปี
2. พยายามป้องกันไม่ให้ถูกสัตว์กัด หรือข่วน
3. หากเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะถูกสัตว์กัดหรือข่วนโดยง่าย เช่น ผู้ดูแลสัตว์ ให้เข้ารับวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าล่วงหน้า



### การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรค

การสัมผัสโรคได้แก่การ โดนกัด ข่วน เลีย ผิวหนังที่มีบาดแผล  
หรือน้ำลายของสัตว์กระเด็นเข้าเยื่อเมือก คือ จมูก ปาก ตา  
และคนที่กินเนื้อสัตว์ที่สงสัย หรือเป็นโรคพิษสุนัขบ้า

การสัมผัสที่เสี่ยง จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน  
โรคพิษสุนัขบ้า ให้ครบถ้วนจึงจะสามารถป้องกัน  
โรคพิษสุนัขบ้าได้



Your pets we care